

Document d'information patient · Radiologie Interventionnelle · Hopital Cochin AP-HP

Ce document vous informe sur l'embolisation des veines peniennes pathologiques pour le traitement de la dysfonction erectile par fuite veineuse.

1. Qu'est-ce que la fuite veineuse ?

La fuite veineuse (insuffisance veino-occlusive) est une cause de dysfonction erectile ou le sang ne reste pas suffisamment dans les corps caverneux pendant l'erection en raison de veines pathologiques qui drainent trop rapidement. Le diagnostic est confirme par cavernosographie.

2. Principe

L'embolisation occlut de facon selective les veines de drainage pathologiques par des coils et/ou de la colle, permettant au sang de rester plus longtemps dans les corps caverneux.

Indication precise : fuite veineuse confirmee par cavernosographie dynamique, apres echec du traitement medical (IPDE5). Bilan andrologique complet indispensable.

3. Deroulement

- Ambulatoire : arrivee le matin, sortie le soir
- Anesthesie locale
- Catheterisme selectif des veines de drainage (via veine femorale ou dorsale)
- Embolisation par coils et/ou colle
- Duree : 1 a 2 heures

4. Suites

- Legere gene perinale possible 24-48h
- Reprise des activites le lendemain
- Evaluation de l'erection a 1 mois, 3 mois et 6 mois

Attention : Signalez tout hematome important, douleur penienne intense ou fièvre apres la procedure.